

KAJSZI

Kajszi környezeti igényei:

Termesztését leginkább befolyásoló környezeti tényező a hőmérséklet. Hazánk a kajszi természettségének északi határán fekszik. A hideg időszakok kritikusak a számára, hazánkban a legfagyérzékenyebb növények egyike. A februári-márciusi erősebb fagyok a virágrügyek szintjén is károkat okozhatnak. A kajszi korán virágzik, ezért a már kifejlődött virágokat, gyümölcskezdeményeket is érheti fagykár. A gyümölcsfák közül az egyik legszárazságtűrőbb, évenként 500-600 mm csapadék már elegendő lehet a számára. A közepkötött, jó vízgazdálkodású, mélyrétegű, meleg és levegős talajok a legkedvezőbbek a számára. Gyökérzete levegőigényes, nem bírja sem a túl tömör, sem a túl nedves talajokat. Savanyú talajokon nem termeszthető eredménnyel, a semleges, enyhén meszes talajok a legjobbak a számára.

Termékenyülés: fajtái öntermékenyek és önmeddők is lehetnek. Önmeddő fajtáknál figyelni kell a porzófajta megválasztására! Jó pollenadó ültetésével az öntermékeny fajták esetén a termésmennyiség növelhető.

Alany: Az oltványok alanyának kiválasztásakor elsődleges szempont a termőhely, a talaj, a télállóság, illetve a nemessel való összeférhetőség.

Vadkajszi: A nemes fajtákkal összefér, erős növekedésű oltványokat nevel, amelyek bőven teremnek. Könnyű, jó víz és levegőgazdálkodású, enyhén meszes vagy semleges talajokra való, viszonylag jól bírja a szárazságot.

Mirabolán (cseresznyeszilva): a vadkajszi alanyhoz képest valamivel gyengébb növekedésű, közepkötött, gyengén meszes talajokon is jól érzi magát. A kissé levegőtlen, nedves talajt is elviseli, a ráoltott nemes fagyérzékenyebb lehet.

Bergeron

Július végén szedhető. Megnyúlt gömb alakú gyümölcsei közepnagyok. Héja narancssárga, a napos oldalon élénkpiros fedőszínnel. Húsa narancssárga, kemény, magvaváló, kellemes ízű. Fája középerős növekedésű, korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem. Kései virágzású, öntermékeny. A téli és tavaszi fagyokkal szemben jól ellenáll.

Ceglédi Arany

Július végén érik, friss fogyasztásra és feldolgozásra is kiváló. Nagyméretű gyümölcsei narancssárgák, napos oldalon pirosas fedéssel. Húsa narancssárga, lédús, nagyon kellemes ízű. Fája erős növekedésű, virágai későn nyílnak, öntermékenyülő, fagyűrése igen jó, a kajszi himlővel szemben toleráns.

Ceglédi bíborkajszi

Július 10-15-e körül érik, termése frissen és feldolgozva is kiváló. Közepes méretű, széles, lapított oldalú gyümölcseinek héja narancssárga, a napos részeken piros fedőszínnel. Húsa narancssárga, magvaváló, rostos, lédús, nagyon ízletes. Fája erős növekedésű, korán termőre fordul, bőven terem. Virágai öntermékenyek. Fagyzugos helyekre érzékeny.

Ceglédi Óriás

Július elején-közepén érik. Igen nagy vagy nagy gyümölcsei tojásdadok. Héja narancssárga, a napos oldalon pirossal fedett, pontozott. Húsa narancssárga, bőlevű, rostos, magvaváló, kellemes ízű. Fája középerős növekedésű, korán termőre fordul. Virágai önmeddők. Porzói: Ceglédi piroska, Ceglédi bíborkajszi, Magyarkajszi.

Gönczi magyarkajszi

Július 10-15-e körül érik, gyümölcse sokféleképpen hasznosítható. Középnagy, kúposodó gömb alakú gyümölcsei narancssárgák, napos oldalon élénkpiros fedőszínnel. Húsa narancssárga, bőlevű, puha, magvaváló, zamatos illatú és ízű. Fája középerős növekedésű, korán termőre fordul. Jó termőképességű, fagy és téltűrése közepes. Virágai öntermékenyek, virágzása elhúzódó.

Magyarkajszi C235

Július közepén érik. Gömbölyded gyümölcsei középnagyok. Héja narancssárga, a napos oldalon piros bemosódással. Húsa narancssárga, lédús, kemény, de különösen ízletes. Fája középmeretű, korán termőre fordul, jó termőképességű. Középkorai virágzású, öntermékeny.

Pannónia

Július közepe után nem sokkal, 20-a körül szedhető. Nagy, gömb alakú gyümölcsei narancssárgák, napos oldalon pirosas bemosódással. Húsa narancssárga, középkevény, bőlevű, rostos, kellemes ízű. Fája gyenge növekedésű, korán termőre fordul, bőven és rendszeresen terem. Középidőben virágzik, öntermékeny.

Forrás: Hegedűs András *Gyümölcs és szőlőfajták (BP. MAKERT)*