

KÖRTE

Körte környezeti igényei:

A környezeti feltételeket tekintve az egyik legigényesebb gyümölcsfajunk. Telepítésekor körültekintően kell eljárni, csak így garantálható a biztos termés. A körte magas vízigényű gyümölcsfaj, a biztonságos terméshez évenként legalább 700 mm csapadékra van szüksége. A kései érésű fajták vízigénye kissé nagyobb, mint a nyári fajtáké. A terméskötődés és az intenzív hajtásnövekedés tavaszi, valamint a gyümölcsnövekedés és a termőrugy differenciálódás a nyár végi-ősz eleji időszaka a két legfontosabb időpont a megfelelő vízmennyiség szempontjából. A talaj vízellátottsága mellett a levegő páratartalom is fontos tényező. Egyes fajták a száraz levegőre a nyári hónapokban levélhervadással, sárgulással válaszolnak. A kiegyenlített klímát kedveli, a szélsőséges hőmérséklet különbségek komoly terméskiesést okozhatnak. A szélsőségektől eltekintve a hazai hőmérsékleti viszonyok megfelelnek a körte termesztésének. A téli fagyokat akár -18C-ig is károsodás nélkül eltűri. Tavasszal korán, az alma előtt virágzik, ezért gyakoribb a virágkárosodás. A talajokkal szemben igényes, közép-kötött, mélyrétegű, jó vízgazdálkodású, tápanyagokban gazdag talajokon ad jó minőségű termést. Rosszabb, szegényes talajokon gyakoriak az apró termések, a gyümölcshúsban erősebb lesz a kősejtképződés. Gyökérszete nem viseli el a magas talajvizet. Az alanynak erős a hatása a fa növekedési erélyére, méretére, termőhelyi igényére, a gyümölcs jellegét viszont nem befolyásolja!

Alany: Vadkörte magonc: Jól viseli a magas mésztartalmú talajokat és az öntözetlen körülményeket. A ráoltott nemesek erős növekedésűek, egészséges, hosszú életű fákat nevelnek.

Árpával érő

Június végén, július elején érik. Friss fogyasztásra alkalmas. Gyümölcse: Kicsi, szabályos, körte alakú, hosszú kocsányú. A gyümölcshéj citromsárga alapszínű, a napsütötte oldalon enyhe aranysárga színeződéssel, húsa fehér, olvadó, enyhén illatos, kellemes ízű. Fája erős növekedésű, terebélyes, de laza koronát nevel. Korán termőre fordul, bőtermő. Porzói: Giffard vajkörte, Vilmos

Bosc Kobak (Kaiser Alexander)

Szeptember közepén szedhető tartós tárolásra alkalmas. Gyümölcse nagy vagy igen nagy, teljes felülete rozsdamázzal fedett. Alakja kissé megnyúlt a kocsány felé keskenyedő. Húsa fehéressárga, olvadó, kövecsségre kevésbé hajlamos. Fája közepes, vagy gyengébb növekedési erélyű. Koronája ritka, elágazódásra kevésbé hajlamos ezért rendszeres metszést igényel. Középkésőn fordul termőre, bőtermő. Porzói: Clapp Kedveltje, Hardenpont téli vajkörte, Vilmos.

Clapp Kedveltje

Augusztus közepe táján szüretelhető, csak rövid ideig tárolható. Gyümölcse középnagy, szabályos körte alakú, gyümölcshéja éretten szalmasárga, a napos oldalon pirossal fedett. Gyümölcshúsa fehér színű, olvadó, bőlevű, illatos, kellemes ízű, elsősorban friss fogyasztásra. Fája erős növekedésű, sűrű, gömbölyded koronát nevel. Porzói: Bosc Kobak, Hardenont téli vajkörte, Vilmos.

Conference

Szeptember első hetében szedhető, hosszú ideig tárolható. Gyümölcsmérete változatos. 120-220 g tömegű, alakja igen megnyúlt körte. A gyümölcshéj alapszíne zöldessárga, foltokban rozsdamázzal fedett. Gyümölcshúsa sárgásfehér, olvadó nagyon édes vajkörte. Fája középerős

növekedésű, vadkörte magonc alanyon sem nevel túl nagy koronát. Középkorán fordul termőre, bőven és rendszeresen terem. Porzói: Guyot Gyula, Vilmos, Hardenpont téli vajkörte.

Fétel Apát (Abate)

Szeptember közepétől szedhető, hosszan tárolható. Gyümölcse erősen megnyúlt alakú, kimondottan nagy méretű 200-300 g tömegű. Héja sárgászöld parafoltos, napsütötte oldalon pirosodó. Húsa fehér, ízletes. Fája lassú növekedésű. Korán termőre fordul. Porzói: Avranches-i jó Lujza, Hardy vajörte, Nemes Krasszán, Vilmos.

Hardenpont téli vajkörte

Október elején szedhető, februárig-márciusig tárolható. Jellemzően szögletes gyümölcse középnagy vagy nagyméretű. Héja nyomódásra érzékeny. Gyümölcs húsa fehér, olvadó, bőlevű. Fája középerős növekedésű. Később fordul termőre, de utána megbízhatóan, bőtermő. Porzói: Bosc Kobak, Clapp Kedveltje, Conference, Vilmos.

Hardy vajkörte

Augusztus végén, szeptember elején szedhető, 1-2 hónapig tárolható. Tojásdad, aszimmetrikus gyümölcse középnagy. Héja vastag, barna parás. Húsa zöldesfehér, tömött, olvadó, bőlevű, kellemesen savas, fűszeres. Fája igen erős növekedésű fölfelé törő, sűrű ágrendszerű. Jó termőképességű. Porzói: Avranches-i jó Lujza, Giffard vajkörte, Vilmos.

Packham's Triumph

Szeptember végén tárolási célból szedhető, október közepére a fán is beérik. Széles, körte alakú gyümölcse nagy, vagy igen nagy. Héj színe sárga. Húsa kősejtmentes, fehér, olvadó vajkörte. Fája középerős növekedésű. Kiegyenlített termőképességű. Porzói: Conferene, Guyot Gyula, Vilmos.

Piros Clapp

Augusztus második hetében néhány nappal a Clapp Kedveltje után szedhető, csak rövid ideig tárolható. Közepes méretű gyümölcsének héja a teljes felületén élénkpiros. Gyümölcshúsa sárgásfehér, olvadó, édes-savas. Fája erősebb növekedésű. Rendszeresen terem. Porzói: Bosc Kobak, Conference, Hardenpont téli vajkörte.

Piros Vilmos (Max Red Bartlett)

Augusztus végén a Vilmos után 5-10 nappal érik, rövid ideig tárolható. Alakja hasonlít a Vilmoséhoz, gyümölcs fedőszíne teljes éréskor barnáspiros. Fája középerős növekedésű. Porzói: Bosc Kobak, Clapp Kedveltje.

Vilmos

Augusztus második felében szedhető. Szabályos körte alakú gyümölcse középnagy vagy nagy. Héja sárga színű, a napos oldalon enyhén pirosodó. Húsa fehér, olvadó, bőlevű, illatos, édes-savanykás ízű, muskotályos zamatú. Korán termőre fordul, minden évben megbízhatóan terem. Porzófajtái: Bosc Kobak, Clapp kedveltje, Conference, Packham's Triumph.

Nemes Krasszán

Október elején szedhet, elsősorban tartós tárolás céljára. Gyümölcsei nagyok, vagy igen nagyok, hengeresek, lapított gömb alakúak. Héjuk sötétsárgás, a napos oldalon némi pírral. Húsa feér, olvadó, bőlevű, inkább savas, mint édes. Fája gyengébb növekedésű, korán termőre fordul. Porzófajtái: Hardy vajkörte, Packham's Triumph, Téli esperes

Japán körte (NASHI)

A körte nemzetség egy része Európából, míg jelentős részük Ázsiából származik. A *Pyruspyrifolia* vagyis homoki körte elterjedési területe Kína, Japán és Korea. Termesztett fajtái japán körte vagy nashi körte néven hódították meg a világot, de almakörtének és vízkörtének is hívják őket. A gyümölcsök gömb alakúak, kis vagy közepes méretűek, a héjukon a paraszemölcsök nagyon sűrűn helyezkednek el. A gyümölcsök színe sárgás, aranybarnás, húruk kemény, roppanó, magas víztartalmú, ízük édeskés illatos, a gyümölcsök már a fán beérnek. Ökológiai igényeik hasonlóak az európai körtékhez, azoknál azonban jóval magasabb páratartalmú levegőt igényelnek, különben a gyümölcsök kisebb méretűek lesznek, a levelek megperzselődnek és lehullanak. A Nashi körték mind önmeddőek, ezért porzófajtat igényelnek szintén a Nashi fajtakörből.

Hosui

Augusztus végén, szeptember elején érik. Gyümölcse nagy, héj színe aranybronzos, húsa roppanó, lédús, kissé savas. Fája erős növekedésű. A 2-3 éves termőgallyakon terem, ezért koronáját folyamatosan ifjítani kell. Korán termőre fordul, termőképessége jó. Porzófajta: Nijisseiki.

Forrás: Hegedűs András *Gyümölcs és szőlőfajták (BP. MAKERT)*